

# FAVOR

*Soja très précoce  
Début à milieu de groupe 000*

*L'essentiel*

*Allie productivité  
et précocité*

*Très bonne teneur  
en protéines et PMG  
élevé*

*Très bonne agronomie  
sur tout le cycle*



**caussadesemencespro**

# FAVOR

Soja très précoce début à milieu de groupe 000



## Profil variétal

Inscription : UE 2019
Groupe 000 : Début à milieu de groupe
Débouché : Alimentation animale et humaine
Croissance : Semi déterminée
Couleur de gousse : Brune
Couleur du hile : Brun foncé
Terminaison foliaire : Arrondie ovale
Couleur floraison : Violette
Teneur en protéines : Élevée
Rendement protéines : Élevé
Teneur en huile : Moyenne

## Profil agronomique

	Bonne	Vigueur au départ
	Courte	Hauteur plante
	Assez haute	Hauteur 1 <sup>ère</sup> gousse
	PS	Sensibilité verse
	PS	Sensibilité Sclérotinia
	Assez élevé	PMG
<b>Sélectivité Herbicides</b>		
	MS	Sélectivité Pendiméthaline
	MS	Sélectivité Métobromuron
	PS	Sélectivité Métribuzine

AS : Assez Sensible – S : Sensible – MS : Moyennement Sensible

PS : Peu Sensible - TPS : Très Peu Sensible

Sources : CTPS/GEVES/ARVALIS Institut du végétal/R&D CAUSSADE SEMENCES PRO

## L'essentiel

🌿 Allie productivité et précocité.

🌿 Très bonne agronomie sur tout le cycle.

🌿 Très bonne teneur en protéines et PMG élevé.

🌿 Peut convenir pour des débouchés alimentation humaine.

Résultats essais France

Variété	Rendement pluriannuel (q)				Teneur en protéines (%)	Rendement protéines (%)	PMG	Hauteur plante (cm)	Hauteur 1 <sup>ère</sup> gousse (cm)
	2018	2019	2020	Moyenne					
FAVOR	39,5	38,4	29,1	35,7	41,4	15,7	193,8	73	11,4
%/moyenne	101,3	101,9	98,9	100,8		109,8			
Points/moyenne					+1,2		+11,8	-11	+0,7
Moyenne	39	37,7	29,4	35,4	40,2	14,3	182	84	10,7
Nombre de références	14	18	20	52	24	24	26	20	13


Source : base de données CAUSSADE SEMENCES PRO

## Préconisations

• **Conseils de semis** : privilégier un semoir monograinne à 2 ou 3 cm de profondeur semer dans un sol réchauffé (>10°C), ressuyé. S'assurer que les températures soient supérieures à 10°C les jours suivant le semis. Penser à adapter les préconisations pour des semis tardifs, en dérobé ou en culture biologique.

• **Écartement entre rangs** : privilégier un écartement de 15 à 30 cm.

### • Zone de culture



■ culture principale  
■ culture dérobée ou semis tardifs  
Source : Terres Inovia

### • Densité de semis

Conduite	Obj. peuplement (pieds / ha)	Densité semis (graines / ha)
Sec ou conditions stressantes	600 000	670-750 000
Irrigué ou bonnes conditions	550 000	620-700 000